



COMPOSITION:

25 mg/ml or 50 mg/2ml Chlorpromazine HCL.

PROPERTIES:

Chlorpromazine HCL "NEURAZINE-MISR" has a depressant action on the brain stem with little or no action on the cerebral cortex of the spinal cord. NEURAZINE is a major tranquillizer capable of inducing a state of calm and reduced motor activity in doses which do not produce hypnosis. It depresses the vomiting and heat regulating centers and may relieve intractable hiccup. NEURAZINE induces a state of indifference to pain: in addition, it enhances the action of analgesics so that they may be employed in much reduced dosage.

INDICATION:

- In psychiatry : To reduce anxiety, agitation, and tension in psychoneurosis and in manic-depressive patients, specially in the manic phase.
- Senile agitation.
- Behavior disorders in children.
- Antiemetic: in uremia, gastro-enteritis.
- Carcinomatosis.
- Drug induced nausea, and vomiting.
- Anaesthesia: As preoperative medication and to reduce postoperative vomiting.
- To reduce hypothermia.
- In malignant diseases: To potentiate analgesia and delay the need to increase the doses.
- Tetanus: Adjunct to control convulsions and diminish pain, exhaustion and fear.
- Miscellaneous: Persistent hiccup, heat stroke, severe pruritus, eclampsia

SIDE EFFECTS:

-Extrapyramidal symptoms may occur secondary to Thorazine, consist of:

- Parkinsonian symptoms.
- Dystonia.
- Akathisia (restless).
- Tardive dyskinesia.

-Hypotension and interference with temperature regulation are dose-related side-effects and are liable to cause dangerous falls and hypothermia in elderly.

-Neuroleptic malignant syndrome.

-Other side effects:

- Drowsiness, apathy, agitation, excitement and insomnia, convulsions, dizziness, headache, GIT disturbance,
- Anti-muscarinic symptoms, cardio-vascular symptoms (such as : hypertension, tachycardia and arrhythmia)
- Endocrine effect such as menstrual disturbance, galactorrhea, gynecomastia, impotence and weight gain.
- Blood dyscrasias such as agranulocytosis and leucopenia.
- Photosensitisation, rashes, jaundice, and purplish pigmentation of the skin, cornea, retina and conjunctiva.

-N.B:

I.M injection may be painful, cause hypertension and tachycardia.

CONTRAINDICATION:

- Hypersensitivity to phenothiazines.
- Don't use in comatose states or in the presence of large amounts of CNS depressants (Alcohol, Barbiturates and narcotics) and in pheochromocytoma.

PRECAUTIONS:

During the first few days of treatment, patients taking NEURAZINE are advised not to drive vehicles or to use machinery.

NEURAZINE should be used with caution in elderly and debilitated patients, in those with history of hepatic impairment and jaundice and in the presence of a low leucocytic count, and those with arteriosclerosis, cardiovascular disease, or other conditions in which a sudden drop of blood pressure may be undesirable.

Most antipsychotics are best avoided during pregnancy unless essential and it is advisable to discontinue breast feeding during treatment.

NEURAZINE should be used with caution in several respiratory disease.

Antipsychotic drugs are not indicated in the treatment of dementia-related psychosis. This is because their use is associated with increased risk mortality in elderly patients treated for dementia related psychosis.

"Use in specific population/ Pregnancy(non-teratogenic effects):

Neonates exposed to antipsychotic drugs, during the third trimester of pregnancy are at risk for extrapyramidal and/or withdrawal symptoms following delivery. There have been reports of agitation, hypertonia, hypotonia, tremor, somnolence, respiratory distress and feeding disorder in these neonates. These complications have varied in severity: while in some cases symptoms have been self-limited: in other cases neonates have required intensive care unit support and prolonged hospitalization.

"These products should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus"

DOSAGE:

- In psychiatric states : 75-500 mg daily in divided doses
- As antiemetic and for other conditions : 25-50 mg t.d.s.
- Children over 5 years ; 1/3 - 1/2 of the adult dose.
- Below this age : 1-2 mg/ kg bodyweight in 24 hours.
- In the treatment of tetanus, infant : may be given 10 - 25 mg i.m. every 4 hours according to age.

During the first few days of treatment, patients taking NEURAZINE are advised not to drive vehicles or to use machinery.

NEURAZINE should be used with caution in elderly and debilitated patients, in those with a history of jaundice and in the presence of a low leucocytic count, and those with arteriosclerosis, cardiovascular disease, or other conditions in which a sudden drop of blood pressure may be undesirable.

PACKAGING: Boxes of 6 & 100 ampoules of either strength.



نيورازين حقن

كلوربرومازين هيدروكلوريد

التركيب:

كلوربرومازين هيدروكلوريد ٢٥ مجم / ١ مل ، ٥٠ مجم/٢مل

الأثر الطبي:

النيورازين: (كلوربرومازين هيدروكلوريد- مصر) دواء ذو تأثير قوى له قدرة على خلق حالة من الهدوء وقلة النشاط الحركي بجرعات لا تبعث على النوم وهو مثبط مركزي القى و تنظيم الحرارة و يزيد فعالية العقاقير المسكنة للألم.

دواعي الاستعمال:

- مسكن للتوتر العصبي المصاحب لبعض الأمراض العصبية و النفسية .
- مضاد للقئ المصاحب للتسمم البولي و النزلات المعوية و البول السكري والغثيان و القئ الناتج من تعاطي بعض الأدوية.
- لعلاج الفواق و ضربة الشمس والحكة الشديدة.

موانع الاستعمال:

الحساسية للفينوثيازين

لا يستخدم في حالات الإغماء أو في وجود كميات كبيرة من مثبطات الجهاز العصبي المركزي (الكحول، باربيتورات و المخدرات) و مرض القوائم.

الأعراض الجانبية:

من الممكن أن تحدث أعراض خارج الهرمي ثانوية نتيجة لاستخدام مادة الثورازين و هي :

- الشلل الرعاش.
- خلل التوتر.
- قلق القعود.
- خلل الحركة.
- أعراض جانبية تعتمد على الجرعة و تشمل انخفاض ضغط الدم و اضطراب في تنظيم حرارة الجسم الذي قد يؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة لدى كبار السن.
- أعراض جانبية أخرى:
- النعاس، البهامة، التوتر، الإثارة، الأرق، التشنجات، الدوار، الصداع، اضطرابات الجهاز الهضمي، أعراض الجهاز القلبي الوعائي (مثل ارتفاع ضغط الدم، زيادة ضربات القلب و عدم انتظام ضربات القلب)
- اضطراب الهرمونات.
- اضطراب في خلايا الدم.

ملحوظة:

الحقن العضلي لهذا الدواء من الممكن أن يكون مؤلم و قد يسبب ارتفاع في ضغط الدم و زيادة ضربات القلب.

التحذيرات:

ينصح المرضى في الأيام الأولى من العلاج ب نيورازين بعدم القيادة أو استخدام الماكينات. يستعمل بحذر في الحالات الآتية: كبار السن، المرضى الذين يعانون من الوهن، المرضى الذين لديهم تاريخ في قصور خلايا الكبد و الصفراء، في وجود نقص في كرات الدم البيضاء، تصلب الشرايين، أمراض الجهاز القلبي الوعائي أو في الحالات الأخرى التي يحدث فيها انخفاض مفاجئ لضغط الدم الغير مرغوب فيه. يفضل تجنب معظم أدوية العلاج النفسي أثناء الحمل إلا عند الضرورة القصوى و ينصح بعدم الرضاعة أثناء العلاج. لا تستخدم الأدوية المضادة للذهان في علاج الذهان الناتج عن خرف الشيخوخة، و ذلك لأن المرضى كبار السن المصابون بالذهان الناتج عن خرف الشيخوخة، الذين يخضعون للعلاج بالأدوية المضادة للذهان، أكثر عرضة للوفاة.

الاستعمال أثناء الحمل:

تأثيرات غير تشويهيية

يمكن أن يصاب الأطفال حديثي الولادة، الذين يتعرضون للأدوية المضادة للذهان في الثلاث شهور الأخيرة للحمل، بأعراض خارج هرمية و/أو أعراض الانسحاب بعد الولادة. و قد تم تسجيل بعض الحالات عاني فيها هؤلاء الأطفال من سرعة الاستتارة، الضغط المفرط، ارتخاء العضلات، الرعاش، النعسان، ضيق في التنفس، اضطرابات الأكل. تراوحت هذه المضاعفات في شدتها، وفي بعض الحالات كانت الأعراض محدودة ذاتيا، في حين احتاج حديثي الولادة في بعض الحالات الأخرى إلى الدخول في وحدة العناية المركزة و المكوث في المستشفى لفترة طويلة.

يجب أن يتم استعمال هيدروكلوريد الكلوربرومازين أثناء الحمل فقط إذا كانت الفوائد المرجوة منه تفوق المخاطر المحتملة على الجنين.

الجرعة:

لعلاج الامراض العصبية و النفسية: من ٧٥ - ٥٠٠ مجم يوميا على جرعات مقسمة.
لعلاج حالات القئ و الحالات الأخرى : ٢٥ - ٥٠مجم ثلاث مرات يوميا.
الأطفال أكثر من ٥ سنوات: ثلث - نصف جرعة البالغين يوميا.
أقل من ٥ سنوات : ١-٢ مجم لكل كجم يوميا.

العبوة:

علبة بها ٦ ، ١٠٠ أمبولة

شركة

مصر للمستحضرات الطبية

كيلو ٤ طريق بلبس الصحراوي بعد محطة الرسوم - الخانكة - ابوزعل - القليوبية- مصر

فاكس: ٢٠٢٤٩٢١٠٣٠٢

تليفون: ٢٠٢٤٩٢١٠٣٠٦

البريد الإلكتروني: misr_reg2009@hotmail.com